

CAMBIOS CALENDARIO VACUNACIONES Y ESTRATEGIAS TEMPORALES

Orden SAN/1844/2016 del Consejero de Sanidad, de 13 de diciembre – Circular DGSP 04/2016

En vigor el 10/01/2017, desde ese día se deja de administrar: vacuna hepatitis B al nacimiento -excepto hijos de madres portadoras o no cribadas- y 3ª dosis hexavalente a los 6 meses de edad.

Los niños se “incorporarán” al nuevo calendario “2+1” al nacimiento -suspensión vacunación universal Hep B- o a los 6 meses -suspensión de la 3ª dosis de primovacunación a los 6 meses-.

Los niños que ya hayan recibido antes del 10/01/2017 la 3ª dosis de vacuna Hexavalente a los 6 meses continuarán con la pauta “3+1”.

Edad	0 m	2 m	4 m	11 m	12 m	15 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
Cambios 2017	HB	HB VPI DTPa Hib Nc	HB VPI DTPa Hib Nc MC	HB VPI DTPa Hib Nc	Nc MC SRP	Var	VPI DTPa Hib	SRP Var	VPI DTPa/dTpa	MC VPH Var	dT VPH
Nota	a	b	b	b/c	b/d	e	d	e	f	g/h	h

En verde, nuevas vacunaciones. En rojo, vacunaciones transitorias adaptación calendario.

- a.** Hepatitis B al nacer solo para hijos de madres portadoras AgHBs o madres sin control previo. Circular DGSP 03/2016.
- b.** Neumococo, solo nacidos en 2016 y siguientes, dosis adicional a los 6 meses en aquellos niños con factor de riesgo.
- c.** Se suspende dosis de los 6 meses desde el 10/01/17: Niños con pauta 2+1: recibirán recuerdo a los 11 meses Hexavalente y Neumococo; no recibirán recuerdo neumococo a los 12 meses ni con Pentavalente a los 18 meses.
- d.** Niños con pauta 3+1 -ya con 3ª dosis a los 6 meses-: No recibirán recuerdo a los 11 meses ni Hexavalente ni Neumococo; recuerdo a los 12 meses de Neumococo y a los 18 meses de Pentavalente.
- e.** Varicela, solo para nacidos en 2015 y siguientes. La 2ª dosis comenzará a administrarse cuando la cohorte de 2015 alcance los 3 años de edad.
- f.** Se administrará DTPa-VPI -vacuna de alta carga antigénica y polio inactivada- a los vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen los 6 años. Los vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa -baja carga-. Vacuna dTpa/DTPa retrasada para los niños nacidos en 2010 y 2011 a la espera de disponibilidad de dosis -Circular DGSP 05/2015-.
- g.** Varicela 12 años, solo para personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas previamente. Pauta 2 dosis, separadas entre sí al menos 1 mes, idealmente 2 meses.
- h.** VPH solo para las chicas. Pauta de 2 dosis, separadas entre sí, 6 meses. En 2017, a 14 años para nacidas en 2003.

Se mantiene vacunación frente a tosferina -dTpa- a embarazadas en el último trimestre gestación. Circular DGSP 06/2015.

Se recuerda la importancia de **no retrasar la administración de vacuna hexavalente** a los 2 y 4 meses.

HB: Hepatitis B; VPI: Vacuna Polio Inactivada; Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b; Nc: Neumococo conjugada; DTPa: Difteria, Tétanos, Pertussis (tosferina) acelular de alta carga; dTpa: Difteria, Tétanos, Pertussis acelular carga reducida; Td: Tétanos, Difteria tipo adulto; SRP: Sarampión, Rubeola, Parotiditis; Var: Varicela; MC: Meningococo C conjugada; VPH: Virus del Papiloma Humano.