

EDAD	CALENDARIO OFICIAL DE ARAGÓN 2017		VACUNAS NO FINANCIADAS
2 meses	Hepatitis B-Polio-Difteria-Tetanos-Tosferina-Haemophilus b (<i>Infanrix hexa</i>)	Hexavalente	Rotavirus (<i>Rotateq</i> o <i>Rotarix</i>)
	Neumococo (<i>Prevenar13</i>)	En calendario solo para nacidos a partir de 2016	
2,5-3 meses			Meningococo B (<i>Bexsero</i>)
4 meses	Hepatitis B-Polio-Difteria-Tetanos-Tosferina-Haemophilus b (<i>Infanrix hexa</i>)	Hexavalente	Rotavirus (<i>Rotateq</i> o <i>Rotarix</i>)
	Meningitis C (<i>NeisVac-C</i>)	Si vienen de otras CCAA y no llevan misma marca (<i>NeisVac-C</i>) pueden necesitar 2 dosis: 2 y 4 meses	
	Neumococo (<i>Prevenar13</i>)	En calendario solo para nacidos a partir de 2016	
4,5-5 meses			Meningococo B (<i>Bexsero</i>)
6 meses	Hepatitis B-Polio-Difteria-Tetanos-Tosferina-Haemophilus b (<i>Infanrix hexa</i>)	Hepatitis B-Polio-Difteria-Tetanos-Tosferina-Haemophilus b (<i>Infanrix hexa</i>) <u>SOLO HASTA EL 9-1-17</u>	Rotavirus (sólo si se eligió <i>Rotateq</i>)
		* Neumococo (<i>Prevenar 13</i>) <u>SOLO SI EXISTEN FACTORES DE RIESGO</u>	Meningococo B (<i>Bexsero</i>)
11 meses	Hepatitis B-Polio-Difteria-Tetanos-Tosferina-Haemophilus b (<i>Infanrix hexa</i>)	<u>A PARTIR DE JUNIO 2017</u> NIÑOS QUE LLEVEN PAUTA 2 HEXAVALENTES EN PRIMER AÑO (2, 4 M)	
	Neumococo (<i>Prevenar13</i>)	<u>A PARTIR DE JULIO 2017</u> (Los que llevan Hexavalente con 11 meses)	
12 meses	Meningitis C (<i>NeisVac-C</i>)		
	Triple Vírica (Sarampión-Rubeola-Parotiditis) (<i>MMR vaxPro</i>)	Dosis antes de los 12 meses no cuentan, hay que revacunar.	
	Neumococo (<i>Prevenar13</i>)	<u>SÓLO HASTA JUNIO DE 2017, A LOS QUE NO LA HAYAN RECIBIDO CON 11 MESES.</u> En calendario (financiada) solo para nacidos a partir de 2016	
15 meses	Varicela (<i>Varivax</i>)	No tener en cuenta antecedente de haberla pasado en primeros meses de vida. En calendario nacidos a partir de 2015	Meningococo B (<i>Bexsero</i>)
18 meses	Polio-Difteria-Tetanos-Tosferina-Haemophilus b (<i>Pentavac</i>)	Pentavalente (sin HepB) <u>SOLO HASTA ENERO 2018, A LOS QUE RECIBIERON 3 HEXAVALENTES 2, 4, 6 M</u>	
3 años	Triple Vírica (Sarampión-Rubeola-Parotiditis) (<i>MMR vaxPro</i>)	En calendario nacidos a partir de 2012. Nacidos antes la ponemos a los 6 años	
	Varicela (<i>Varivax</i>)	Nacidos a partir de 2015 (la empezaremos a poner a partir de 2018)	
6 años	Difteria-Tétanos-Tosferina (dTpa) (<i>Boostrix</i>) Cambiamos a DTPa-VPI en 2022	De momento está suspendida por orden de SP a nacidos a partir de 2010 Y 2011.	
		* Triple vírica (<i>MMR vaxPro</i>) SOLO NIÑOS NACIDOS ANTES DE 2011 QUE LLEVEN SOLO 1 DOSIS	
12 años	Meningitis C (<i>Neis Vac-C</i>)		

	Papiloma Humano (<i>Cervarix</i>)	2 dosis separadas 6 meses, solamente a niñas nacidas a partir de 2004. Nacidas en 2002 y 2003 la ponemos a los 14 años	
		* Varicela (<i>Varivax</i>) la pondremos a aquellos que no la han pasado ni se han vacunado antes hasta el año 2026. 2 dosis separadas 2 meses	
14 años	Difteria-Tétanos (Ditanrix adultos)		
		* Papiloma Humano (<i>Cervarix</i>) niñas nacidas en 2002 y 2003. 2 dosis separadas 6 meses	

VACUNACIÓN ORAL FRENTE A ROTAVIRUS*:

	ROTATEQ®	ROTARIX®
Rango de edad de administración de dosis	6 a 32 semanas	6 a 24 semanas
Nº de dosis	3	2
1ª dosis	6 a 12 semanas**	6 a 20 semanas (preferible antes de 12 sem)
Ultima dosis	No más tarde de las 32 semanas	No más tarde de las 24 semanas (preferentemente primeras 16 semanas)
Intervalo entre dosis	Al menos 4 semanas***	Al menos 4 semanas
Prematuros	Desde la 25 semanas de EG	Desde las 27 semanas de EG
Vómito de la dosis	Si vómito de dosis completa se puede plantear administrar otra dosis en la misma visita; pero en general, y sobre todo si ha sido vómito parcial, no hace falta.	Si vómito de dosis completa se puede plantear administrar otra dosis en la misma visita; pero en general, y sobre todo si ha sido vómito parcial, no hace falta.

* No son vacunas intercambiables; usar siempre mismo preparado.

** La primera dosis de Rotateq debe ser antes de cumplir los 3 meses de edad.

***Pauta habitual: Rotateq 2, 4, 6 meses (o 2, 3, 4 meses) y Rotarix 2, 4 meses (o 2, 3 meses)

Pueden coadministrarse con cualquier otra vacuna del calendario. No precisan guardar ningún intervalo con otras vacunas del calendario.

VACUNACION FRENTE A MENINGOCOCO B (BEXSERO®)

	Nº total de dosis (primovacunacion + recuerdo)	Intervalo mínimo entre dosis de la primovacunación	Dosis de recuerdo *
2 a 5 meses de edad	4 (3 + 1)**	1 mes	1 dosis entre los 12 y 15 meses (al menos 2 meses tras terminar primovacunación)
6 a 11 meses de edad	3 (2 + 1)	2 meses	1 dosis en el segundo año de vida, (>12 meses) y al menos 2 meses tras terminar la primovacunación
12 a 23 meses de edad	3 (2 + 1)	2 meses	1 dosis con un intervalo de 12 a 23 m después de acabar la primovacunación
2 a 10 años de edad	2	2 meses	No precisan
A partir de los 11 años	2	1 mes	No precisan

*A excepción de los lactantes que completen primovacunación antes de los 9 meses de vida, para aquellos que necesiten dosis de recuerdo (<2 años), éste se puede recomendar a todos como regla general (y para no liarnos) a los 12 meses de completar primovacunación. Tened en cuenta la edad a la que acabamos la primovacunación (si tiene más de 1 año necesitaremos esperar al menos 12 meses para el recuerdo, si tiene menos de 1 año se podría poner en el segundo año de vida con un intervalo al menos de 2 meses)

** Se puede coadministrar con resto de vacunas del calendario Aragon 2016 excepto NeisVac-C (en este caso dejar >15 días de intervalo)